



2030 Érd, Emil utca 28.

Tel/Fax:23/369-381

Mobil:06-20-950-9073, 06-20-503-2328

E-mail:gyarmati.tamas@gyarimag.hu,info@gyarimag.hu

Honlap: www.gyarimag.hu

Borsó vetőmag

Az étkezési szárazborsó vetésének fontossága elsősorban az abraktakarmány előállításában van. Az abraktakarmányok a koncentrált takarmányok jellemző képviselői, hiszen ezekben a magvakban nagy az energiakonzentráció. Az abraktakarmányok a keveréktakarmány-gyártás alapanyagai, és mint ilyenek elsősorban a tápfogyasztó állataink a sertés és a baromfi takarmányozásában játszanak fontos szerepet. Nagy táplálóanyag koncentrációjuk révén nélkülözhetetlen a nagy termelésű kérérdzők rendszerében is.

Takarmányborsó vetőmag/tavaszi/: A tavaszi vetésű takarmányborsó vetőmagot elsősorban zöldtakarmány termesztés céljából vetik. Zabbal vagy bükkönnyel, kora tavasztól folyamatosan vethető. Nagy vegetatív zöldtömeget ad, mely felhasználható zöldtakarmány célú etetésre, szénázásra, illetve szenázsként is alkalmazható. Jó fehérjeforrás a takarmányoknál, emellett kiváló elővetemény.

Takarmányborsó vetőmag/őszi/: Az őszi takarmányborsó vetőmag termesztése energiatakarékos és környezetbarát. Zöldtakarmány termelés céljából tiszta vetésben a vetőmag mennyisége 120-130 kg/ha, őszi búzával vagy árpával vetve 100kg borsó és 40kg búza, illetve őszi árpa vetőmag felhasználása célszerű. A keverékben a kalászos a támasztónövény szerepét is betölti, de egyidejűleg a zölden való etetésnél illetve szilázs készítésnél szárazanyag és keményítő forrás is. Energiatakarékos, mert sem tiszta vetésben, sem keverékben nem igényel jelentős mennyiségű nitrogén műtrágyát, mivel a borsó gyökerén képződő gyökérgümőkben élő baktériumok - a borsó kezdeti fejlődésétől eltekintve - annyi légköri nitrogént kötnek meg, hogy a saját szükségletén kívül a társnövény részére is jut elegendő. Gazdaságos mert a vetőmag normája viszonylag alacsony. Vetése október elejétől november elejéig.

Salamanca borsó(abraktakarmány)

Előnyök:

- Bőséges termés és kiváló állóképesség
- Könnyű betakaríthatóság
- Nagy termésbiztonság
- Magas fokú agro-ökológiai alkalmazkodóképesség

Sárga magvú, nagy termőképességű, magas fehérjetartalmú borsó, kiemelkedő állóképességgel. A teljes növényállomány az erős kacsoknak köszönhetően nagyon jól összekapaszkodik, így betakarítása veszteségektől mentes. Étkezési és takarmánycélú alapanyagként egyaránt hasznosítható

Zekon borsó(abraktakarmány)

Állami elismerés éve: 1998.

Gazdasági értéke, termesztési javaslat Kiváló küllemi tulajdonságokkal rendelkező, biztonságos termést adó fajta. Állóképessége kiváló. Jelentős szántóföldi ellenállóképességgel rendelkezik liztharmattal és vírusos betegségekkel szemben. Fuzáriumos tőhervadással szemben rezisztens. Fehérjetartalom: 19,5-21,5% Érés: középérésű Ezermagtömeg: 210-240 g Termőképessége: 3,0-3,6 t/ha Javasolt vetőmagmennyiség: 230-280 kg/ha Javasolt vetési csíraszám: 1,0-1,1 millió/ha Borsóból 200 kg, zab vetőmagból 150 kg szükséges vegyes vetésben.

Irina borsó(abraktakarmány)

Magja kissé tojás alakú. Levélkés típusú. Szára középhosszú, lombszíne sárgás középzöld. Virágzási és érési ideje közepes. Virágja krémszínűbe hajló fehér. Hüvelyei közepesen hosszúak, szélesek, gyengén görbültek, tompa végűek. A magkezdemények száma közepes, ezermagtömege 230-240 g. Hántolva világosabb zöld színű, fakulásra hajlamos.

Gazdasági értéke: Gépi betakarításra alkalmas, intenzív termesztési körülményeket igénylő fajta. Állóképessége közepes. A fuzáriumos tőhervadással szemben ellenálló. Potenciális termőképessége 5-6 t/ha.

Arvika borsó(zöldtakarmány)

Ez a fajta nagy vegetatív zöldtömeggel rendelkezik.. Hatalmas előnye az alacsony ezermagtömeg (120-130 gramm). Hosszú szárral rendelkezik, lila virágú, leveles típusú. Kiválóan alkalmas tavaszi és nyári takarmánykeverékekbe történő vetésre. Felhasználható szenázsként, zöldtakarmánycélú etetésre, szenázásra, sőt zöldtrágyaként is felhasználható. Jó fehérjeforrás a takarmányoknál, ezenfelül kitűnő elővetemény. Magtermését csak akkor takarítják be, ha vetőmag-előállítási céljából történt a vetés.

Vetési idő: Tavaszi takarmánykeverék esetében a lehető legkorábban tavasszal. Nyári keverékek tekintetében pedig az őszi árpa betakarítása után vagy olyan növényfajok után, amelyek hamar lekerülnek a tábláról.

Vetési csíraszám: 0,8-1,2 millió csíra/ha zöldtakarmány esetén; 0,4-0,5 millió csíra/ha borsó-gabona zöldtakarmány keverék esetén (70-80 kg/ha) + 2,0-2,5 millió csíra/ha gabona (zab, tavaszi búza) (80-100 kg/ha).

Általánosan elmondható, hogy jó ellenálló-képességgel rendelkezik a kórokozókkal szemben.

Rubin borsó(zöldtakarmánynak)

Barnászöld színű, márványozott magvú, lila virágú zöldtakarmány borsó. Igen gyors fejlődésű, nagy vegetatív tömeget ad. Szára 80-100 cm-re megnő, állóképessége jó.

Javasolt tőszám(zöldtakarmány esetén): 1 000 000 - 1 100 000 csíra/ha

Termőképessége: 35-45 t/ha (zöldtömeg).

Ezermagtömege: 170-200 g.

Tenyészideje virágzásig: 65-70 nap (javasolt betakarítási időpont).

Zöldtakarmány esetén: 22-25 % fehérjetartalom szárazanyagra számolva.

Javasolt tápanyag ellátás: 150-250 kg összehatóanyag tartalmú 1:1:1 NPK arányú műtrágya hektáronként.

Vegyszerérzékenység nem tapasztalható az engedélyezett vegyszerek tekintetében.